

شعار شرکت: ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره

اهمیت مصرف فسفات و هیومیک اسید در مرکبات

عنصر فسفر در مرکبات علاوه بر بهبود ریشه دهی و افزایش رشد درخت، نقشی مهم و بسیار تاثیرگذار را ایفا می کند.

عنصر فسفر در مرکبات تعیین کننده طعم میوه است و باعث خوش طعم شدن و افزایش بازار پسندی میشود.

در اثر کمبود فسفر برگ های مسن، رنگ سبز تیره خود را از دست داده، باریک و ارغوانی رنگ می شوند. بافت میوه زبر و ضخیم و هسته آن توخالی می شود که همین اتفاق ضرر زیادی به باغدار وارد می کند

استفاده از کود هیومیک اسید برای مرکبات ضروری بوده و مزیت های فراوانی دارد. از مهم ترین آثار این کود روی مرکبات می توان به افزایش رشد و باروری اشاره کرد که میزان برداشت محصول به شکل چشمگیری افزایش می یابد. همچنین کیفیت میوه ها بیشتر شده و از نظر حجم و اندازه بسیار مرغوب می شوند. در باغات مرکبات به کار بردن کودهای هیومیک اسید موجب می شود تا بازدهی و راندمان درختان بالا رفته و محصول باکیفیت و بیشتری تولید شود. این کود همچنین مقاومت درختان را بالا برده و از آن ها در شرایط محیطی تنش زا محافظت می کند.

روش های کنترل غیر شیمیایی علف هرز در باغات مرکبات

۱. پیگیری علف های هرز و رعایت بهداشت باغ

۲. استفاده از کود کاملاً پوسیده و چال کردن آن: علف های هرز موجود در کودهای حیوانی توزیع شده در باغ به سرعت رشد و مشکل را هر ساله تکرار می کنند.

۳. تمیز کردن وسایل و تراکتور از بذر علف هرز

۴. با یک بار شخم در اواخر زمستان و یکبار در اواسط بهار و یکبار در اوائل پائیز عملاً عمده علف های هرز از بستر خاک جدا می گردد. در باغ های سنتی بدلیل عدم امکان تردد تراکتور در جوی و پشته ها، باغداران پس از آبیاری، شخصاً باید نسبت به خارج کردن علف های هرز از جوی ها اقدام نمایند.

۵. گیاهان پوششی بین ردیف های درختان: وجود یک پوشش ملایم از علف های هرز یکساله باعث کاهش تبخیر، افزایش رطوبت نسبی و طراوت باغ و کاهش آفتاب سوختگی میوه ها می گردد.

۶. کود سبز: کاشت گیاهانی مانند ماش، لوبیا و برگشت آن ها به خاک علاوه بر تقویت خاک تا حدود زیادی علف های هرز را کنترل می نماید.

۷. استفاده از مالچ: از شاخه های کوچک هرس شده درختان، خاک برگ، کاه و کلش گندم و جو به عنوان مالچ آلی استفاده می شود. بقایای اکثر گونه های گیاهی قادر به تولید و آزادسازی ترکیبات دگرآسیب هستند که از این خاصیت در جهت جلوگیری از جوانه زنی، استقرار و رشد علف های هرز استفاده می شود.

واحد تولید بذر شرکت سبز دینه



تولید و توزیع انواع بذر سبزی و صیفی

شماره تماس جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت:

۰۹۰۵۸۶۱۳۰۳۵

۰۶۱-۴۲۳۲۶۹۶۷

هیومیک اسید پودری و پرک پلنت استار

مناسب جهت مصرف در باغات و مزارع

کیفیت بالا

قیمت به صرفه

نشانی: دزفول، کیلومتر ۲ جاده محمد بن جعفر، شرکت تعاونی تولید روستایی سبز دینه



گل شمعدانی

خشک شدن خاک بین دو آبیاری
کاهش آبیاری در زمستان
آبیاری هنگام صبح

نورپسند

نیاز به ۴-۶ ساعت نور غیرمستقیم آفتاب

دمای مناسب بین ۱۸-۱۳ درجه

جدا کردن ساقه های مرده و پژمرده
نیچی کردن قسمت های پوسیده گل

نوددهی هر ۲ هفته یکبار در طول فصل رشد
استفاده از کودهای محلول در آب
عدم کوددهی در زمستان

مخلوطی از خاک جنگلی، تورب و ماسه
نیاز به خاک دارای زهکشی مناسب و بدون ماده آهکی